

萬氏秘傳片玉心書

原缺

荒錢失懷青囊者未嘗不歎  
恨也幸五世孫萬通之獲秘  
藏於千百泥磚蓋魯壁之經亦  
直不欲從此道於後漢焉者邑  
人士尚方悅李師朱雲  
暇僉請討煉而慮工浩

難成余與通之謀曰通之有小  
兒片玉痘疹乃寄

所和

而金書未經載者曷先刊

金書之藉通之欣然乃出屬補

友致訂授梓踰年載而始就

嗣后金書漸次刊行然足

小兒一書圖彩方症採妙鉤  
元洵廬扁之精微肯堂之未  
及闡悉者如許奇珍寧不  
寶貴世父母斯人小兒乃幸矣  
雖然仁壽

一出將民也

矯之于上俱遊於堯天舜日

中矣詎謂賢之書非采庸  
教鐸之功德哉誰謂萬民  
之書不成於仁人孝子之聞

揚就企傳今磨以誌不朽云

省

順治之甲午歲季夏穀

旦邑人呂蔡劉一炁書題

萬氏秘傳片玉心書目錄

卷之一

活幼指南賦

慈幼做心賦

卷之二

小兒總治法

卷之三

水

今

額印

鼻準論歌

承漿兩眉論歌

風池氣池兩順論歌

兩臉論歌

現形色總論

命門部位圖附歌

小兒肺法

歌

則論歌

兩太陽論歌

兩額金匱風門論歌

五位所屬

現形色西江月

小兒治法

卷之四

胎毒門

痰熱門

驚風門

嘔吐門

瀉泄門

吐瀉門

痢疾門

卷之五

瘧疾門

發熱門

哮喘門

咳嗽門

心腹痛門

浮腫門

黃疸門

夜啼門

大小便門

目病門

鼻病門

舌病門

咽喉門

諸瘡門

斑疹癰疹門

網

高痺門

負門

角

口瘡門

牙齒門

形聲門

丹毒門

秘傳十三方

目錄終

萬氏秘傳片玉心書卷之一

山東泰安州李正齋方悅父醫傳

羅田萬全密齋著

活幼指南賦

小兒方術號曰啞科口不能言脉無可施惟察色以  
為憑竭心思而施治故善養子者似養龍以調護  
不善養子者如抵牾而傷借愛之愈勤害之愈急  
乍頭溫而足冷忽多涕而不眠之毫釐失之千  
里此小兒方術專門以補化之不及

腸胃脆薄于飲食易傷筋骨于指于風寒易襲父  
母何知看承太弛重綿厚襖及以陽以耗陰流飲  
放飯持敗脾而慎胃門異聲見異物失于隄防深  
其居簡其出過于周密然期而行立于喜其長成  
無事而嘻笑于謂之聰慧一旦病生焚親心戚不  
信醫而信巫罔求藥而求鬼乃人事之弗修謂天  
命之如此

欲觀氣色先分部位左頰于青龍屬肝右頰于白  
虎屬肺天庭高而離陽心火地低而坎陰腎水鼻

雙順即  
頰之兩  
傍

中惡即  
為之極

在面中脾通氣現乎色之所現知乎病之所起不  
況脾應乎唇肺通乎鼻舌乃心苗目為肝液胃流  
注于雙頰腎開竅于兩耳爪則筋餘而脾為之運  
變則血餘而腎為之主脾司手足腎連牙齒苟本  
臟之或衰即所屬之先憊能辨形色兮似挺撞鐘  
若昧朕兆兮如石投水  
凡觀乎外可知其內面色現  
青青色露而驚  
悸如煤之黑兮中惡之因似橘之黃兮脾虛之謂  
白乃瘵癆紫為熱急青邊口角扁鵲難醫黑掩太

朱雀即  
 心經心  
 屬火  
 龍仁屬  
 水火即  
 水卿即  
 火龍水  
 青龍即  
 肝經屬  
 木

陽虛醫莫治年壽亦光兮多生膿血山根青色兮  
 頻見灾危能察色以知由也按圖而索驥  
 朱雀貫於雙瞳兮火水通青龍統于四白兮肝  
 乘肺位泄痢而帶陽者須防咳嗽而拖藍者可畏  
 腹痛方殷常面青而唇撮驚風欲發先頰赤而目  
 眦火光微不兮外感風寒金氣浮又兮中藏癰積  
 乍黃乍白兮癰熱連綿又青又赤兮風和緊急察  
 之既精治之得理鴉聲魚口枉費心機肉折皮乾  
 空勞氣力

氣色改移形容變易氣乏則顙門成坑血衰則頭  
毛作穗眼生眵淚兮肝風瞤目口流涎沫兮脾冷  
滯頤面目虛浮定膨脹而氣喘眉毛顰蹙則肚痛  
以多啼蛇回兮脾胃漸敗面瘡兮肝臟先虧為瞋  
眩而弗瘳縱神仙亦何益

手如數物兮驚風將

如塗硃兮心火已熾坐

卧愛冷兮煩

煖兮風寒之畏壯大

脚小脾欲困而成痺耶

張勢已危而必斃弄

舌脾熱解顙腎憊重舌者蓋熱積于心脾硬氣

喘氣實火浮于肝肺齟齬宣露必是牙疳哺露丁

奚多緣食積齟齬作渴日自利夜啼分為四証

變蒸周于一歲心熱欲言能脾虛無時而好

睡病後失聲者腎怯啼失聲者肺痿肚痛而青

水流出者虫腹痛而大便酸臭者積口頻撮而脾

虛舌長伸而火熾龜胸是肺火脹于胸膈龜背乃

腎風入于骨髓鼻乾黑燥弓火盛金衰肚大筋青

并木強上瀆

丹瘤瘡疥皆胎毒之流連吐泄瘡痢乃積食之沾

滯不能吮乳者熱在心脾嘗欲俯臥者火薰腸胃  
喜視灯火煩熱在心愛吃泥土癖熱在脾腹痛寒  
侵口瘡熱積臍風忌于一臘火丹畏于周歲驚自  
熱來癇因痰致吐泄而精神耗者則危瘡痢而飲  
食減者必瘵

驚本心生風由肝致變分左右考証有順逆藥分  
補泄考病有虛實急驚由于積熱之深涼泄便宜  
慢驚得于大病之後溫補為貴頭掣目窳而氣喘  
考上工莫醫口禁鼻張而是冷考神丹何濟閉目

者無魂枉叫者多祟不知吞吐必見閻羅反加悶  
乱者終歸蒿裡既明症候次知調理

胎毒用甘草黃連食積用白朮枳實急驚搐掣以  
導赤泄清慢驚痰癇以瀉心瀝氣集聖去疳備急  
治積抱龍丸化痰鎮驚胃苓丸補脾開胃夜啼須  
退熱清心疳熱必養血升提理中止泄香連止痢  
積熱不除涼驚丸大有神効沉寒難療養脾丸最  
為審秘痰火攻心三黃丸水谷不化芩金丹一粒  
柴苓治瘥月蟬消痞潮熱金花咳嗽玉液瘡疥者

胡麻丹瘤者涼膈吐泄而渴者白朮可投煩熱而  
渴者益元為最斑疹兮消毒腹痛兮脾積衄血咳  
血者茅花重舌木舌者針刺口瘡不愈者洗心腹  
脹不食者平胃五拗治喘四苓利水退黃消腫胃  
苓加減以堪行破積安重集聖從容可治大抵  
嬰兒易為虛實調理最取其平補泄無過其劑尤  
忌巴牛勿多今在幸熱走氣以耗陰苦寒敗陽而  
損胃如逢食積解之不可或遲若遇虛羸補之尤  
為至急總少俄延便成勞弊

慈幼傲心賦

醫門治例幼科最難腸胃脆而多傷乳食筋骨嫩而易感風寒易虛易實兮變如反掌或補或泄兮貴若轉丸酸多泄腎酸甚扶肝苦入心而寒涼損胃奔走肺而燥熱傷元欲求中正無過平耳或病瀕于瞋眩兮勿犯其毒且淫治于權宜兮但取其能中病即已救本為先苟悞救于湯藥即便致于損殘此上工誓於活人而良醫驗于拆肱

嘗聞法無一定但占症候區不三世勿服湯丸病者

詳于擇術醫者務于收瘥視疾若已見利勿貪先  
察運氣于陽陰妙契次觀形色于順逆了然春夏  
陽而苦寒可用在夫人之勇健秋冬陰而辛溫可  
泰相其人之勞瘁既溫反補已寒再宣七神離散  
五臟虧崩雖番心于方脉于何補于世反致人傷  
殃于獲罪于天是故胎疾于急于解毒食積于利  
在消痺治分二法効可十全襁褓未寧但調其母  
閭閻不快當固其元悲夫腸胃中和豈堪藥石微  
乎氣血難弱以漸發生治非得已病有卒然如護

風燭心常凜。若惜掌珠意惟拳。醫可補乎司  
命應無忝于家傳。

且如病則熱起熱則驚生或治熱以熱或攻熱以  
寒熱在表而柴葛解肌可飲熱在裏而芩連消毒  
急煎積熱無如集聖虛熱妙以調元要在識夫脉  
色不可妄按湯丸貽終身之痼疾促嬰兒之壽年  
輕以變重功不補患徒委命于氣數不詳審手簡  
編前車既覆後轍猶然魂魄遊于郊野哭聲達于  
淵泉賊此之故是誰之愆嗟夫渡蟻駕橋放雀解

其况伊萬物之灵匪值一虫之賤不知謹密遽爾  
輕泛排惻阨之良心如見入井考聖賢之遺訓如  
弗及泉居易慮險因蹶知便証隨百出治無一偏  
燮調造化保養真元善攻不如善守宜急不若宜  
緩種杏成林踵當年之董奉植橘名井見今日之  
蘇耽奈何泄久變痢積久成痺瘡久生瘡驚久成  
癰未至番連弓攻之宜速已見沉疴弓治之且緩  
腸胃秘塞急泄而已氣血虛羸弓急補而安外毒  
急攻世令入腹表邪急解世令再傳餘則緩而調

理嘗恐急而生妄若藥下咽猶防其過治或中病  
勿張其能知者常慮一失死者不可復全與其悔  
于已悞孰若謹于未然欲求魚兔當守筌蹄苟尋  
方而治病宜三復于斯言

小兒總治法

面赤發熱服涼驚黃白發熱用胃苓身熱便秘三黃  
下瘦弱發熱集聖靈安蒸發熱用挈法驚風導赤  
吞泄青泄瀉胃苓用一粒熱泄玉露散同行寒泄  
理中丸可服泄瀉白朮散生津痢疾保和同香連  
瘡疾養脾瘡自平咳嗽玉液降痰氣喘腫胃苓引  
灯心瘡疥胡麻丸最好養脾最是保孩嬰細重寸  
白用集聖臨時用藥細叮嚀

小兒初生臍風

初生三五日大便血。嘗來黑色為胎毒。鮮紅實可哀。  
初生便嘔吐。胞漿蓄胃中。物尽吐自止。不止便為毒。  
小兒初生十日內。少乳多啼。常噴嚏。急看。口中珠  
泡。手法括去。免憂慮。

不看撮臍風。撮臍糞少通。急用解毒散。便下得涎容。  
便閉肚彭脹。口緊咬唇青。時上手足掣。臍風枉用心。  
腹脹不便名鎖肚。口緊不乳是噤風。目直叫哭。蟹腸  
吊天。吊身仰似角弓。初生某兒有此病。父母歡喜

一場空。

小兒交蒸

小兒初生多交蒸。三十日細推論。如蚕之眠添智。慧遍身發熱不惺。

交蒸休用藥。三日自然安。舒減惺散。傷食保和丸。惺散內用人參。并桔川等。白茯苓。經。幸少許。天花粉。防風。白朮。九味行。

小兒胎疾

胎熱并草黃連湯。胎寒去連加桂方。胎黃并草加茵。豫胎驚衣砂一味良。胎瘦胎肥浴躰法。胎怯五軟。

用地黃此是家傳真口訣兒孫記誦莫遺忘

肝色多青心赤紅脾黃肺白腎黑同黃白痿虛黑中  
惡赤紅是熱青驚風

小兒五臟部位

五臟有外候不離正面聞耳乃腎之竅兩眼原屬肝  
鼻吼肺為主脾唇心舌尖左頰屬木肝生風右頰  
屬金肺位同頰為心火顙為腎準顙鼻上位居中  
五臟外症

肝主風子目直視闕亂叫哭不安寧心主熱兮不得

眠驚悸飲水口舌乾脾主困弓多幻嘔吐淵瘦弱  
病成痺肺主氣弓多咳嗽安乾髮枯喘綿七腎主  
虛弓胎氣弱小兒腎弱米應難

看小兒虎口紋

今人專看虎口紋風關氣關命關今風關病輕氣關  
重命關若過死時臨青筋紅熱黑勢惡直輕斜曲  
重看云

脉法

小兒一指分三位息數須將六至看七至八至數為

熱三至四至遲虛寒堅實平和無病新細小沉遲  
有病者

按全嬰等書云小兒三歲已前虎口第一指上寅卯  
間有脉絃見者可驗病伏男左女右視之脉絃從  
寅開起不至卯開者病易治若連于卯開者病難  
治如寅連卯上過辰開者十難救一若脉絃小或  
短者病可治宜參視之

小兒夜啼

啼哭直視熱在肝泄青一服即時安啼哭面赤熱在

心導赤麥冬効如神面赤四逆腹中痛益黃散用  
姜湯送夜上見灯多拘攣父母嬌愛多不足

### 驚風

急症驚風面赤青目多直視不回睛手足搐掣牙關  
緊以怕昏口再不醒

驚來插人中虎口拿捻筋泄青吞導赤調理治涼驚  
口眼耨喎斜看他左右偏太陽頻了穴一焯自然  
安

面色黃白神氣弱昏睡眼閉口不合口鼻氣冷手足

冷慢驚搐掣時止作

慢驚不可醫調元急補脾漸醒能食吉常昏不乳危

吐瀉

吐泄之病面赤黃有寒有熱有食傷面紅熱渴難調  
理手足寒時急補陽

吐泄常治法胃苓一粒丹脾積去食積理中補虛寒  
吐泄多傷食益黃散最宜看他病畧退胃苓再補脾  
泄瀉常如是消積功十全

泄瀉作渴白朮散人參白朮茯苓甘草香干葛霍香

藥常與服之真格言

瀉甚烏梅加入熱甚知母門冬虛煩甘草炙用隨症  
用藥不同

痢症

痢疾赤白皆是熱眉頭赤面中疼身熱脈大難得  
退脈小身涼容易安

痢症多因積先下木香丸保和消滯積止痢用香連  
痢疾若不食噤口痢必殘急用香連散能食保平  
安

小兒瘡疾

瘡疾之色多黃黑痛至作寒又作熱早瘡日未容易

退晚瘡間治宜急

初瘡要吐痰斬鬼及崇山久瘡不可截養脾功十全

咳嗽

行寒飲冷即傷肺咳嗽病來多痰氣面青氣促怕生  
驚面白胸高還不言

初咳要發表五拗并九寶氣實葶藶宜肺虛阿膠好  
嘗服玉液丸桔梗同甘草

五物用麻黃杏仁甘草強石羔臘茶葉發汗是奇方  
九寶蘇葉配麻黃薄荷陳皮杏桂良大腹桑白同用  
若烏梅加入細參詳

### 痺癆

面色黃白是痺癆肚大頸細頭羸焦折乳傷食大病  
後只怕時上熱來潮

痺症無多法集聖初如神面色轉紅活相間服胃苓  
潮熱如不退只防作慢驚

### 傷食

傷食發熱面赤紅惡心腹脹痛時攻露身怕熱不思  
食症與傷寒大不同

傷食宜調解霍香散最宜保和同與服病退再養脾  
若是成驚搐惟有下為奇

傷食發熱用霍香蘇葉香付朴陳蒼半夏黃連甘草  
曲茯苓引子用生姜

傷寒

傷風發熱面色赤煩悶不困不思食喜人喂抱畏風  
寒作渴便秘裏必實

惡寒病在表敗毒拿法好裏實三黃丸驚未泄青計  
敗毒發表用姜防升麻紫葛鮮肌涼前胡枳壳耳草  
桔蘇葉人參用成湯

### 浮腫

小兒浮腫因風濕久瘡脾虛有之  
上身主風下主濕養脾一法  
少人知

遍身若浮腫胃苓丸裡求避風行浴法  
切莫用牽牛  
肚大有青筋灯火又處燂內用集聖丸  
胃苓宜相兼

口瘡

小兒驚口瘡白屑珠凡良赤瘡姜連散洗心是奇方  
洗心散內用麻黃荊芥薄荷赤芍當白朮將軍同  
國老臨時煎服入生姜

牙根爛成瘡走馬疳可防出血又作臭蚊蛤散宜良  
小兒口流涎滯脾虛寒益黃加蒼朮不治必成疳  
瘡瘡

遍身疥瘡是何因血熱由來胎毒成痛痒不安多夜  
哭切莫入腹命歸雲

瘡疔不宜搽胡麻丸最佳入腹宜解毒驚來莫治他  
雜症

小兒吃泥土脾熱用泄黃集聖相間服成不可常  
小兒合面睡原來熱在心只用導赤散泄心與涼驚  
小兒多白尿落地如米泔胃冷湯送數服解憂煎  
小兒大便清和熱在肝經只用泄青丸此法効如神  
小兒糞焦黃和熱在脾鄉誰知泄黃散端的是奇方

五臟外症

吐泄瘡疾病在脾驚風心肝兩經為咳嗽喘病在

肺髮稀骨軟腎元虧

五軟病症

如小兒五軟有胎稟不足軟者有大病後軟者有悞服涼藥軟者胎稟軟者地黃丸主之六病後軟者參苓白朮丸主之服涼藥軟者加味八味地黃丸主之已上三症若不急治有傷真元久則成癰以致不可治者多矣

萬氏家傳片玉心書卷之二

羅田齋萬全著

公孫通之萬達刻

水鏡訣

夫阴阳運合男女成形已分九竅四肢乃生五臟六腑部位各分順逆難明若憑寸口之浮沉必乃橫亡于孩子湏明虎口辨別三關終詳用藥必无差悞未至三歲止看虎口男左女右從第二指第一節名風關若脉見初交病第二節為氣關脉見則

惟治第三節為命關脉見則死不當辨其色若三  
關青四足驚三關赤水驚三關黑人驚紫色泄痢  
黃色雷驚三關脉通度是急驚之症必死餘病可  
治或青或紅有紋如線一直者是乳食傷脾及發  
熱驚左右一樣者是驚風積齊發有三條或散是  
肺生風痰或似鉤鈴聲有青是傷寒及噉如紅火  
是瀉有黑用麻車下痢紅多白痢黑多是赤痢有  
紫相兼加渴不虛虎口脉紋亂乃氣不和也蓋脉  
紋見有色皆曰黃紅紫青黑由其病甚色能加變

如黃紅之色紅盛作紫紅紫之色紫盛作青紫青  
之色青盛作黑青黑之色至于純黑之色者不可  
治矣又當辨長珠形主夾積傷滯肚腹疼痛寒熱  
飲食不化來蛇形主中脘不和積氣攻刺臍腹不  
寧乾嘔去蛇形脾虛冷積泄瀉神困多腫弓反裡  
形主感寒熱邪氣頭目昏重心神驚悸倦怠四肢  
稍冷小便赤色弓反外形主痰熱心神恍惚作熱  
夾驚夾食風癇症候鎗形主邪熱痰盛生風癰瘍  
驚風魚骨形主驚癇熱水字形主驚積熱煩燥心

# 指掌形圖



神迷悶夜嘔痰盛口噤搐搦針形主心肺受熱  
 極生風驚悸煩悶神困不食痰盛搐搦透關射指  
 主驚風痰熱四症皆聚在胸膈不散透關射指主  
 驚風惡候受驚傳入經絡風熱發生十死一生唯  
 治此十三位形脉悉有輕重察其病根則詳其症

男以左手側看之

女以右手側看之

虎口者人手處是也

三關者二指三節是也

風關第一節寅位是也

氣關第二節卯位是也

命關第三節辰位是也

風關指頭上節

卯關指中節

寅關指下節

命關死候

氣關病源

風關易治

未關命門

中關氣候

初關風候

凡嬰兒生下一月至三歲以前頭有虎口脉次指辰

節為命關火氣關次風關所謂初得風關病危可  
傳入氣命定難陳湯氏云小兒初生至五歲血氣  
未定呼吸至數太過必辨虎口脉色方可察病之  
於男男驗左手女驗右手蓋取左手屬陽男以陽  
為主右手屬陰女以陰為主然男女一身均具此  
明陽左右兩手亦當參驗左手之紋病應心肝右  
手之紋病應肺脾知此消息又得變通之意驚風  
初得紋出虎口或在初關多是紅色傳至中關色  
赤而紫青病又傳過其色紫青病勢深重其色青

胃而紋亂者病深重若見純黑在惡不治大抵紅  
者風熱輕赤者一風熱甚紫者驚熱青者驚積青赤  
相半驚積風熱俱有主急驚風青而淡紫伸縮來  
去主慢驚風或紫系青系黑系既主相雜似出不  
出主慢脾風脈紋從寅關起不至卯關者病易治若  
連卯關者有病難治如寅關連卯關者十  
難救一若脈紋小或短者病不妨如紋勢彎曲  
入裡者病雖重而症順純可用力故勢弓反出外  
發者靠于指甲者斷不可回其有三關紋如流珠

流米三五點相連或形于面或形于身危惡尤甚

八門候歌三首

五指稍頭冷驚來不可安若逢中指點必定是傷寒  
心指獨自冷麻痘症相傳女右男左分明仔細看  
初起寅閑淺紋侵過卯疾生終不治良位實難禁  
辨虎口指脉紋訣

氣紋黃盛作紅、盛作紫、盛作青、盛變黑純黑  
則難治矣

黃色無形者即安紫脈也紅若無形亦安寧脈也有

前數樣形者即病之脈次第而變初作一點于氣  
多紅脈至風關其病危急純黑分明不可療治  
左有紅紋似線形定知發熱又或驚  
右有双紋如左狀脾傷驚積一齊生  
紋頭有似三叉樣肺氣生痰夜作声  
青赤應是傷寒症只是空紅泄痢生

又微

虎口亂紋多須知氣不和色青驚積聚下乳泄如何  
青即慢驚發入掌肉鈞多三關忽通過此候必沉痾

指上辨青紋

認是四足驚

虎口脉青色

是猪大馬驚

黑色因水撲

黑脉見於面  
狀在末起

赤色火人驚

赤脉見是人  
或跌在大而起

紫色多成瀉

紫脉見者主  
泄痢

黃色是雷驚

黃脉見者因  
大雷聲驚嚇

齒灰風還盛

齒是傷寒併  
有乾熱

芤舌食上焦

齒外是傷寒

但看人手處


方可辨其形

凡小兒三歲以上有病深重危患者指甲口鼻多作

黑色蓋兒脉絕神困症候惡極雖有良藥斷了乎


不可保矣

# 小兒正面圖



# 小兒腦背圖

## 百會穴



凡驚吊後或百會穴  
此係脈青不對耳名

路母血快筋也

後髮際

# 察形色之圖

額印堂山根輪坎

額紅大熱燥青色有肝風印堂青色見人驚火則狂  
 山根青眤了驚遠是兩重若還斯處赤泄燥定捕夜



年壽論歌

年上微黃為正色  
忽有黑色痢厥候

鼻準論歌

鼻準微黃赤白平  
人中短縮吐因痢

正口論歌

正口常紅號曰平

白上失血鼻燒口

若平更陷大難禁  
霍亂吐泄黃色深

黑黃燥黑死唯生  
唇反黑候細必傾

唇乾脾熱積黃生

青黑眇風尽死

承漿兩眉論歌

承漿青色食時驚

數少逆痢紅形

煩燥夜啼青色吉

久病眉紅死症真

兩眼論歌

白睛青色有肝風

君足黃時有積水

或見黑眵黃色現

傷寒病重此其宗

風池氣池兩頤論歌

風氣二池黃吐逆

煩燥啼哭色鮮紅

更有兩頤胚樣赤

肺家客熱此非空

兩太陽論歌

太陽青色驚方始

紅色赤淋萌藥起

要知死症是如何

青色從此生入耳

兩臉論歌

兩臉黃為虛實咽

青色赤忤紅風熱

傷寒赤色紅主淋

二色請詳分兩頰

兩頰金匱風門論歌

吐舌青色滯頰黃

一色頰開兩自詳

風門黑臨青驚水

紋青金匱主驚狂

察色總論

凡看小兒疾病先觀形色而切脈次之蓋面即氣也  
見而五位青色者驚積不散欲發風候五位紅色  
者痰積壅盛驚悸不寧五位黃色者食積癰傷疳  
候痞癖五位白色者肺氣不實滑泄吐痢五位黑  
色者臟腑欲絕病疾危惡面青微青肝之病面赤  
心之病面白肺之病面黃脾之病面黑腎之病先  
別其五臟各有所主次者稟受盈虧胎氣虛實陰  
陽二症補過泄多當收其失兼五臟六腑表裏各

有相應若能辨其標本則神聖工巧矣

五位所屬

心為額南方火 脾為鼻中央土 腎為額北方水  
肺為右頰西方金 肝為左頰東方木

命門部位圖



部位歌

中庭映天庭  
司空及印堂  
額角方廣處  
有病定存亡

青黑驚風惡候和滑澤光不可臨其損唇黑最難當  
青甚煩憂急昏黯亦堪傷此是命門地醫師妙較量  
兒形色西江月

凡觀小兒形色青筋肝熱生風兩腮紅赤熱相攻黃  
色脾虛取用黑氣腹疼中惡白為疳癆生虫如逢  
兩目赤重此是南柯一夢

要識小兒症候但將外貌推求黃浮肌削痞癥瘡唇  
燥面青痛楚吐舌唇焦內熱昏小好睡脾枯手攣  
足掣是驚由疳疾青筋大肚

眼角眇生肝熱口邊涎出脾寒頭毛稀豎血將乾胞  
腫脾家溫顛鼻吼黑焦肺熱耳輪枯燥腎傳胸高  
氣促肺炎了熱慙顛門腫陷

小兒精神忽減面皮黃白无常必因乳食内成傷生  
冷油痰阻當或致腸鳴泄痢或為癰疾難當忽然  
膨脹漸羸疳積虫疳四株  
小兒面皮紅赤兩腮恰似蜜珠風寒外感事何如潮  
熱无時來去或作驚風症治或為斑毒驅除口乾  
啼哭淚如珠睡固

不乳

小兒病形各樣慢憑眼力消詳懷子張縮怕風涼合  
面腫時熱瘧夜啼熱煩腹痛目赤驚搐須防長吁  
短氣熱中藏痰喘上冲火旺

要辨小兒死症顙門陷下成坑喉中拽鋸氣和痰白  
閉无神拘攣口唇牙齦粉白手足冷似冰寒為吉  
口紫眼常翻不乳遺尿悶亂

### 小兒脉法

小兒一歲以上可以看脉以六至為平和七至八至  
為實熱三至四至為遲為虛弱

西江月

小兒尋常脉候一息六至平和七至八至皆生多三四虛寒病作九十連來雀啄一二動指成痾微虛紫數不達訛補泄分明用藥

身熱脉浮可汗身寒脉細休攻喘咳紫數藥无功腫脹細微堪痛泄痢沉遲易愈痘出洪數宜從若吐衄拍浮洪腹疼沉微拈弄

小兒治法

如是胎毒兩腮紅煩渴不止頭面好露揚手擲足大

便閉小便黃身壯熱不退此宜涼解不可服熱補之藥

如足旺冷而眈白吐泄不止肚腹作痛身常振人眼珠青口中冷氣潮熱往來不定此宜溫補不可服涼利之藥

西江月

小兒不宜熱藥兩腮俱帶緋紅手足壯熱火烘六脈浮洪亂動小便赤黃又瀉大便秘結難通掀衣飲水喜當風煩渴鼻流血涕

小兒本宜涼藥而皮皸白无精四肢厥冷似寒水六  
脉浮微沉；吃乳不消嘔吐糞如鴨屎頻；神虛  
暖疼眼珠青病久成痺諸症

小兒純阳之体阴阴不可偏傷常帶三分觀其凉此  
個孩兒易養大抵脾常不足有餘肝氣須防不寒  
不熱藥為良切忌妄行猛浪

小兒何為難治古今號曰難科脉无可執如之何口  
不能言病作父母時；驚怕匠人試驗缺多從醫  
对症用方藥有甚難為捉摸